



Onderzoek incontinentiezorg

Traditionele verzorging vs. Swash® Perineum Wipes





Wie: Verpleegkundige Olga Isart Bosch

Waar: Ziekenhuis de Barcelona - SCIAS

Doel: Onderzoeken of het gebruik van speciale Swash® Perineum doekjes de IAD-incidentie kan verminderen, in vergelijking met de traditionele incontinentiezorg.

Wanneer: Vanaf juli 2017, tot een aantal van 125 patiënten per groep werd bereikt.

Swash® Perineum Wipes (Experimentele groep)


Steekproef: 126 patienten¹ |  38.1% |  61.9%

Traditionele verzorging (Controlegroep)


Steekproef: 125 patienten² |  61.6% |  38.4%

> Studieresultaten

IAD PREVALENTIE



IAD VERHOLPEN



CONCLUSIE



"Onder de voorwaarden van onze studie: op basis van de verkregen resultaten kunnen we zeggen dat het gebruik van de speciale doekjes Swash® Perineum voor incontinentiezorg de incidentie van IAD vermindert, in vergelijking met de traditionele verzorging."
 "De resolutie van IAD in de experimentele groep was bijna 20 procentpunten groter dan in de controlegroep."

- Verpleegkundige Olga Isart Bosch -

¹ 3 patiënten uitgesloten omdat ze niet meewerkten; ² patiënten vervoonden een uitgebreide IAD met schimmelbetrekkenheid die een actuele of systemische farmacologische behandeling vereiste; ³ 85% van de patiënten in deze groep stierf tijdens de opname. ⁴ 9,6% van de patiënten in deze groep stierf tijdens de opname.

SWA20-013 NL