



# Studie zur Inkontinenzpflege Traditionelle Pflege vs. Swash® Perineum Tücher



**Wer:** Krankenschwester Olga Isart Bosch

**Wo:** Krankenhaus in Barcelona - SCIAS

**Ziel:** Untersuchung, ob die Verwendung der speziellen Swash® Perineum Tüchern die IAD-Inzidenz im Vergleich zu der traditionellen Inkontinenzpflege reduzieren kann.

**Wann:** Vom Juli 2017 bis die gewünschte Anzahl an Patienten erreicht wurde.

**Swash® Perineum Tücher** (Experimentalgruppe)


**Stichprobe:** 126 Patienten<sup>1</sup> | 38.1% | 61.9%

**Traditionelle Pflege** (Kontrollgruppe)


**Stichprobe:** 125 Patienten<sup>2</sup> | 61.6% | 38.4%

## > Studienergebnisse

### PRÄVALENZ



### HEILUNGSQUOTE



### FAZIT



“Unter den Bedingungen unserer Studie: Gemäß der Ergebnisse können wir schlussfolgern, dass das Anwenden von speziellen Swash® Perineum Tüchern in der Inkontinenzpflege die Inzidenz von IAD im Vergleich zur traditionellen Pflege verringert.”

“Die Heilungsergebnisse von IAD waren in der Experimentalgruppe mit Swash® Perineum Tüchern fast um 20 Prozentpunkte größer als in der Kontrollgruppe.”

- Krankenschwester Olga Isart Bosch -

<sup>1</sup> Drei Personen wurden ausgeschlossen, da sie nicht zusammen arbeiten wollten; Fünf Patienten wiesen eine umfangreiche IAD mit einem Pilzbefall vor, die einer lokalen oder einer systematischen, pharmakologischen Behandlung bedurften; 10,85% der Patienten in dieser Gruppe sind während der Aufnahme gestorben. <sup>2</sup> 9,6% der Patienten in dieser Gruppe sind während der Aufnahme gestorben.